



ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Данная карточка-памятка содержит важную информацию о безопасности, о которой Вам необходимо знать перед началом приёма лекарственного препарата **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ**, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг и во время лечения. Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому специалисту системы здравоохранения, участвующему в вашем лечении.

Я получаю антикоагулянтную терапию лекарственным препаратом (ЛП) **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ**, (дабигатрана этексилат) в дозе:

75 мг или 110 мг или 150 мг

С целью лечения:

- Профилактика инсульта
- Профилактика венозной тромбоэмболии после ортопедической операции
- Лечение тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии и профилактика их рецидива

Дата рождения: _____

Масса тела: _____

Прием других препаратов (перечислить):

Сопутствующие заболевания:

Контактное лицо на случай развития неотложного состояния (ФИО, кем приходится):

Номер телефона:

Что нужно знать о ЛП **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ**?

- ЛП **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ** разжижает кровь, препятствуя образованию опасных для здоровья кровяных сгустков - тромбов.
- **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ** следует принимать только в строгом соответствии с указаниями лечащего врача.
- Перед началом применения ЛП **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ** сообщите врачу обо всех других лекарственных препаратах, включая пищевые добавки и витамины, которые вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать. Если вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, диклофенак, кеторолак), проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как они могут значительно повысить у Вас риск кровотечения.
- Запрещается прекращать прием препарата **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ** без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку может увеличиться риск образования тромбов.
- Перед операцией или инвазивной процедурой сообщите вашему лечащему врачу о том, что вы принимаете ЛП **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ**.
- ЛП **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ** можно принимать независимо от еды. Капсулу следует проглотить полностью, запив ее полным стаканом воды. Не следует разламывать, разжевывать или открывать капсулу.
- Если Вы забыли принять ЛП **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ**, пропущенную дозу можно принять в том случае, если до приема очередной дозы остается 6 часов и более. Если до приема следующей запланированной дозы остается менее 6 часов, пропущенную дозу принимать не следует. Не принимайте двойную дозу с целью компенсации пропущенной дозы.

«Для получения полной информации о препарате следует ознакомиться с листком-вкладышем.»

В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?

ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ является антикоагулянтом – лекарственным препаратом, который снижает свертываемость крови и предотвращает образование кровяных сгустков, что может увеличить риск кровотечения.

Не начинайте прием препарата **ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ ВЕЛФАРМ** без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений. Немедленно обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов, свидетельствующих о кровотечении: отек, неприятные ощущения, необъяснимые боли или головные боли, головокружение, бледность, слабость, необычные гематомы, носовые кровотечения, кровотечения из десен, длительные и необычные кровотечения из порезов на коже, необычные менструальные кровотечения или вагинальные кровотечения, кровь в моче (может быть красного или коричневого цвета), красный или черный стул, кашель с кровью, кровавая рвота или рвота в виде кофейной гущи.

Если Вы упали или поранились в период, когда получаете препарат (в особенности, если Вы ударились головой), следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Не следует прекращать прием препарата, не проконсультировавшись с лечащим врачом.»