

**Карточка-памятка для пациента,
принимающего препарат МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг**

Для лечения легочной артериальной гипертензии

Лечебный центр: _____

Ф.И.О. врача: _____

Номер телефона врача: _____

Эта Памятка содержит важную информацию о безопасности, которую необходимо знать при лечении препаратом МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ. Держите эту Памятку при себе в течение всего периода лечения препаратом МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ и показывайте ее любому врачу или медицинскому сотруднику, к которому Вы обращаетесь.

Рекомендуемая доза препарата МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день, независимо от приема пищи. Таблетку проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды, нельзя разжевывать, разламывать или делить. Если Вы забыли принять таблетку, ее нужно принять как можно быстрее и затем продолжить регулярный прием препарата в обычное время. Не следует принимать одновременно две таблетки препарата, чтобы восполнить пропущенную дозу.

Для получения дополнительной информации о препарате МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ, пожалуйста, внимательно прочитайте информационный листок для пациентов.

Если у Вас есть какие-либо вопросы о вашем лечении, обратитесь к своему врачу.

Важно немедленно обратиться к лечащему врачу, если Вы забеременели или испытываете какие-либо побочные эффекты во время лечения препаратом МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ.

Беременность

Мацитентан может нанести вред ребенку. Поэтому Вы не должны принимать препарат МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ, если беременны, и Вы также не должны забеременеть во время лечения препаратом МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ или вскоре после его прекращения. Беременность также может привести к серьезному ухудшению симптомов легочной артериальной гипертензии.

Контрацепция

Вам необходимо использовать надежные методы контрацепции во время приема препарата МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ. Обсудите это с Вашим лечащим врачом. Вы должны пройти тест на беременность перед лечением препаратом МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ, затем

тест необходимо выполнять регулярно (1 раз в месяц), пока Вы принимаете препарат МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ.

Анализ крови на анемию и функцию печени

МАЦИТЕНТАН ВЕЛФАРМ может вызвать анемию (снижение количества эритроцитов) и может явиться причиной повреждения печени. Вам потребуется провести анализы крови до начала лечения и периодически во время лечения, чтобы проверить:

- есть ли у вас анемия;
- правильно ли работает ваша печень.

Признаками нарушения работы печени являются:

- тошнота;
- рвота;
- лихорадка;
- боль в животе желтуха (желтушное окрашивание кожи и склер);
- темная моча;
- зуд кожи;
- выраженная усталость (вялость или утомляемость);
- гриппоподобный синдром (боли в мышцах и суставах, лихорадка).

Если Вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно сообщите об этом лечащему врачу или работнику аптеки. Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую:

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Тел.: +7 (800) 550-99-03

E-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Интернет-сайт: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

О побочных эффектах также можно сообщить в ООО «Велфарм-М»:

124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Силино, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 50

Тел.: +7 495 780-00-70, 8 800 250-02-05

e-mail: safety@velpharm-m.ru